

FLUCELVAX^{MD} QUAD 
Vaccin Antigrippal (antigène de surface,
inactivé, préparé en cultures cellulaires)

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AU PATIENT



**FLUCELVAX^{MD} QUAD EST UTILISÉ CHEZ LES ADULTES ET LES
ENFANTS DE 6 MOIS ET PLUS POUR LA PRÉVENTION DE L'INFLUENZA.**

Recommandation
du **CCNI**

Le CCNI recommande les vaccins antigrippaux inactivés préparés en cultures cellulaires, entre autres vaccins antigrippaux, pour les enfants et les adultes de 6 mois à 65 ans.²

Visitez le site destiné au public flucelvax.ca/fr pour plus de détails!

LISEZ CES INFORMATIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE RECEVOIR FLUCELVAX^{MD} QUAD.

L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce vaccin. Discutez-en à votre fournisseur de soins de santé et voyez si **FLUCELVAX^{MD} QUAD** est fait pour vous.



À QUOI SERT FLUCELVAX^{MD} QUAD?

FLUCELVAX^{MD} QUAD est utilisé chez les adultes et les enfants de 6 mois et plus pour aidez la prévention de l'influenza.

L'influenza, plus communément appelée « grippe », est le résultat d'une infection par des virus de la grippe particuliers. De nouveaux types de virus de la grippe peuvent apparaître tous les ans. Le vaccin FLUCELVAX^{MD} QUAD contient des fragments de quatre types de virus de la grippe différents. Chaque année, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) décide des contraintes de virus les plus appropriés qui doivent être inclus dans le vaccin.

Il est impossible de contracter la grippe à cause du vaccin, car le virus qu'il contient est mort et a été séparé en de petites particules non infectieuses.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande la vaccination antigrippale annuelle chez tous les Canadiens aptes à la recevoir.

Pour toute personne qui souhaite réduire son risque de contracter la grippe, il est recommandé de recevoir le vaccin contre la grippe tous les ans. FLUCELVAX^{MD} QUAD a été utilisé par de nombreuses personnes pour réduire leur risque de contracter la grippe.

COMMENT FLUCELVAX^{MD} QUAD AGIT-IL ?

Le vaccin FLUCELVAX^{MD} QUAD agit en aidant votre corps à se protéger contre l'infection par les types de virus de la grippe contenus dans le vaccin. Le vaccin stimule la production par le corps de substances nommées anticorps. Les anticorps combattent le virus de la grippe. Si vous êtes vacciné, votre corps peut habituellement détruire rapidement les virus de la grippe correspondant à ceux contenus dans le vaccin lorsque vous entrez en contact avec eux, ce qui peut faire en sorte que vous n'attraperez pas l'influenza.

Après la vaccination, il faut quelques semaines à votre corps pour développer complètement une protection efficace contre le virus de la grippe.

La protection contre la grippe nécessite généralement une seule dose du vaccin FLUCELVAX^{MD} QUAD. Certaines personnes n'ayant jamais été vaccinées contre la grippe, notamment des enfants de moins de 9 ans, peuvent avoir besoin de deux doses.

Comme pour tous les vaccins, une protection à 100 % ne peut pas être garantie.

**FLUCELVAX^{MD} QUAD n'est pas fait à partir d'œufs;
il ne contient aucune protéine d'œuf.**

Les composants de la seringue et de la fiole ne contiennent pas de latex. FLUCELVAX^{MD} QUAD est considéré comme sans danger pour les personnes allergiques au latex.

Les seringues préremplies de FLUCELVAX^{MD} QUAD ne contiennent aucun agent de conservation ni antibiotique. La formulation en fiole multidose de FLUCELVAX^{MD} QUAD contient un agent de conservation, mais aucun antibiotique.



RECOMMANDATIONS



CCNI

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande les vaccins antigrippaux inactivés préparés en cultures cellulaires, entre autres vaccins antigrippaux, pour les enfants et les adultes de 6 mois à 65 ans².



SCP

La Société canadienne de pédiatrie (SCP) encourage la vaccination annuelle contre la grippe de tous les enfants et jeunes dès l'âge de 6 mois³.



SOGC ET CCNI

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) recommande d'offrir un vaccin antigrippal inactivé à **toutes les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse, de même qu'aux femmes qui pourraient être enceintes au cours de la prochaine saison de la grippe**⁴.

Le CCNI recommande aussi fortement qu'un vaccin antigrippal inactivé préparé en cultures cellulaires, entre autres vaccins antigrippaux, soit offert aux femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse^{5†}.

† Afin d'éviter les effets secondaires et d'assurer une utilisation adéquate, parlez à votre professionnel de la santé si vous êtes enceinte. Votre professionnel de la santé sera en mesure de discuter des risques et des avantages potentiels de FLUCELVAX^{MD} QUAD pendant votre grossesse. L'innocuité de FLUCELVAX^{MD} QUAD pendant la grossesse n'a pas été évaluée dans le cadre d'essais cliniques randomisés.

N'UTILISEZ PAS FLUCELVAX^{MD} QUAD SI:

- Votre enfant est âgé de moins de 6 mois. L'utilisation du vaccin FLUCELVAX^{MD} QUAD n'est approuvée que pour les enfants de 6 mois et plus.
- Vous ou votre enfant avez ou avez eu une allergie à FLUCELVAX^{MD} QUAD ou à un des ingrédients énumérés dans le présent feuillet.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre FLUCELVAX^{MD} QUAD afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, à vous ou à votre enfant, notamment:

- **Si vous avez ou avez eu une réaction à la vaccination avec une ou plusieurs des manifestations suivantes:**
 - Réaction allergique grave
 - Difficulté à respirer
 - Gorge enflée
 - Perte de connaissance ou effondrement
 - Crise d'épilepsie ou convulsions
 - Syncope, présyncope
 - Température élevée (plus de 38,5 °C)
 - Réaction cutanée importante au point d'injection, y compris des bleus importants
- **Si vous avez une infection ou que votre température est plus élevée que 38,5 °C.** Votre médecin pourrait choisir de reporter la vaccination jusqu'à ce que la maladie soit passée. Une maladie mineure comme un rhume ne constitue généralement pas une raison pour reporter la vaccination.
- **Si le traitement par certains médicaments a affaibli votre système immunitaire**
- **Si vous avez ou avez eu le syndrome de Guillain-Barré (SGB)** Une maladie qui touche le système nerveux et provoque une paralysie.
- **Si vous êtes allergique à d'autres médicaments ou à d'autres substances.**
- **Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.** Votre professionnel de la santé pourra discuter avec vous des risques et des bienfaits potentiels associés à l'administration de FLUCELVAX^{MD} QUAD pendant que vous êtes enceinte ou que vous allaitez.
- **Si vous vous êtes évanoui ou avez ressenti une sensation de faiblesse lors d'une injection antérieure.** Un évanouissement peut survenir après, ou même avant, toute vaccination. Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les blessures dues aux chutes.

INFORMEZ VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ DE TOUS LES PRODUITS DE SANTÉ QUE VOUS PRENEZ, Y COMPRIS: MÉDICAMENTS, VITAMINES, MINÉRAUX, SUPPLÉMENTS NATURELS OU PRODUITS DE MÉDECINE DOUCE.

COMMENT FLUCELVAX^{MD} QUAD SERA ADMINISTRÉ:

L'administration de FLUCELVAX^{MD} QUAD se fait par injection dans un muscle, en général dans le haut du bras.

DOSE HABITUELLE:

L'administration de FLUCELVAX^{MD} QUAD est annuelle et se fait de la manière suivante:

- Pour les adultes et les enfants de 9 ans et plus: une injection de 0,5 ml.

Pour les enfants de 6 mois à moins de 9 ans qui reçoivent le vaccin antigrippal pour la première fois, il est recommandé d'administrer une dose de suivi (rappel) de FLUCELVAX^{MD} QUAD 4 semaines après la première dose.

En cas d'omission de la seconde dose, consultez votre professionnel de la santé pour fixer un nouveau rendez-vous dès que possible.

SURDOSE:

SI VOUS CROYEZ AVOIR REÇU TROP DE DOSES DE FLUCELVAX^{MD} QUAD OU AVOIR REÇU LE VACCIN PAR ERREUR, COMMUNIQUEZ IMMÉDIATEMENT AVEC VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ, LE SERVICE DES URGENCES D'UN HÔPITAL OU VOTRE CENTRE ANTIPOISON RÉGIONAL, MÊME SI VOUS NE PRÉSENTEZ PAS DE SYMPTÔMES.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES QUI POURRAIENT ÊTRE ASSOCIÉS À FLUCELVAX^{MD} QUAD?

En prenant FLUCELVAX^{MD} QUAD, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que ceux qui figurent dans la liste ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Voici une liste d'effets secondaires fréquents ou très fréquents de FLUCELVAX^{MD} QUAD. La plupart d'entre eux sont légers et disparaissent rapidement. Si vous ou votre enfant ressentez des effets secondaires dérangeants, informez-en votre médecin:

- Douleur, rougeur, durcissement ou enflure au point d'injection
- Nausées, vomissements, diarrhée
- Maux de tête
- Perte d'appétit
- Douleur aux muscles ou aux articulations
- Bleu
- Fatigue
- Frissons
- Shivering



Les enfants plus jeunes peuvent aussi ressentir les effets secondaires fréquents ou très fréquents suivants:

- Sensibilité au site d'injection
- Irritabilité
- Envie de dormir
- Changement des habitudes alimentaires.
- Fièvre

Si vous ressentez un des **effets secondaires graves** ci-dessous, **consultez votre professionnel de la santé:**

- **Anaphylaxie:** Difficultés à respirer, étourdissements, pouls rapide et faible, éruption cutanée.
- **Réaction allergique:** Éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire sur la peau, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de toute autre partie du corps.

EN CAS DE SYMPTÔME OU D'EFFET SECONDAIRE GÊNANT NON MENTIONNÉ DANS LE PRÉSENT DOCUMENT OU D'AGGRAVATION D'UN SYMPTÔME OU D'UN EFFET SECONDAIRE VOUS EMPÊCHANT DE VAQUER À VOS OCCUPATIONS QUOTIDIENNES, PARLEZ-EN À VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS

Si vous ressentez un effet secondaire à la suite d'une vaccination, veuillez le signaler à votre médecin, à votre infirmière ou à votre pharmacien.

Si vous souhaitez obtenir des informations sur l'atténuation des effets secondaires, veuillez contacter votre professionnel de la santé. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Santé Canada et Seqirus ne peuvent pas fournir de conseils médicaux.



Pour en savoir davantage au sujet de FLUCELVAX^{MD} QUAD, vous pouvez :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements pour les patients sur les médicaments. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada, le site Web du fabricant (www.cslseqirus.ca) ou par téléphone, au 1-855-358-8966.
- **Visiter flucelvax.ca**



Le numéro d'identification du médicament (DIN) de **FLUCELVAX^{MD} QUAD** est le 02494248. Votre compagnie d'assurance pourrait vous demander ce numéro.

Pour signaler une réaction indésirable présumée, veuillez communiquer avec :

Courriel: ae.reporting@seqirus.com

Téléphone: 855-358-8966

Lorsque vous y êtes invité, faites le 1.

Références:

1. Monographie de produit FLUCELVAX^{MD} QUAD.
2. Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI). Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2024-2025 (2023).
3. Société canadienne de pédiatrie. Les recommandations relatives aux vaccins antigrippaux administrés aux enfants et aux adolescents pour la saison 2023-2024.
4. Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. SOGC Clinical Practice Guideline, No.357-Immunization in Pregnancy (2018).
5. Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI). Directives mises à jour sur la vaccination antigrippale pendant la grossesse (2023).
6. Données internes
7. Données internes



FLUCELVAX^{MD} QUAD



Visitez le site destiné au public flucelvax.ca/fr pour plus de détails!

FOIRE AUX QUESTIONS

Le CCNI recommande-t-il l'utilisation des vaccins antigrippaux inactivés préparés en cultures cellulaires comme option vaccinale?

Recommandation du CCNI

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande les vaccins antigrippaux inactivés préparés en cultures cellulaires, entre autres vaccins antigrippaux, pour les enfants et les adultes de 6 mois à 65 ans².

FLUCELVAX^{MD} QUAD est-il réservé aux patients allergiques aux œufs?


Non. FLUCELVAX^{MD} QUAD peut être administré à tous les patients admissibles âgés de 6 mois ou plus.³

La vaccination contre la grippe est-elle recommandée pour les enfants de 6 mois ou plus?

Oui. En fait, la Société canadienne de pédiatrie (SCP) encourage la vaccination annuelle contre la grippe de tous les enfants et jeunes dès l'âge de 6 mois pour aider à prévenir la grippe.⁴

La vaccination contre la grippe est-elle recommandée pour les femmes enceintes?

Oui. En fait, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) recommande d'offrir un vaccin antigrippal inactivé à toutes les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse, de même qu'aux femmes qui pourraient être enceintes au cours de la prochaine saison de la grippe pour aider à prévenir la grippe.⁵

 FLUCELVAX^{MD} QUAD est-il nouvellement offert au Canada?

Non. FLUCELVAX^{MD} QUAD est offert au Canada depuis:¹

- 2019 pour adultes et les enfants âgés de 9 ans ou plus
- 2021 pour les enfants âgés de 2 ans ou plus
- 2022 pour les enfants âgés de 6 mois ou plus

Quelle est l'expérience de FLUCELVAX^{MD} QUAD dans le monde?

Plus de 250 millions de doses ont été distribuées dans le monde.^{6,7}

Quels sont les effets secondaires possibles de FLUCELVAX^{MD} QUAD?

Les effets secondaires fréquents, ou les plus fréquents, sont la douleur, la rougeur, le durcissement et le gonflement au point d'injection, ainsi que des maux de tête, des douleurs musculaires ou articulaires, de la fatigue, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, une perte d'appétit, des ecchymoses et des frissons. Les enfants plus jeunes peuvent présenter une sensibilité au point d'injection, une irritabilité, une somnolence, une modification des habitudes alimentaires et de la fièvre. La plupart de ces effets secondaires sont légers et ne durent pas longtemps. Informez votre professionnel de la santé si vous ou votre enfant présentez des effets secondaires qui vous dérangent, y compris ceux qui ne sont pas listés ici.¹

† Afin d'éviter les effets secondaires et d'assurer une utilisation adéquate, parlez à votre professionnel de la santé avant d'utiliser FLUCELVAX^{MD} QUAD. Votre professionnel de la santé sera en mesure de discuter des risques et des avantages potentiels de FLUCELVAX^{MD} QUAD. L'innocuité de FLUCELVAX^{MD} QUAD pendant la grossesse n'a pas été évaluée dans le cadre d'essais cliniques randomisés.

CSL Seqirus

CSL Seqirus Canada
Kirkland, Québec
www.cslseqirus.ca
☎ 1.844.392.8582
☎ 514.221.4877

© 2024 Seqirus. Tous droits réservés.
Seqirus est une marque commerciale de Seqirus U.K. Limited ou de ses filiales. FLUCELVAX^{MD} QUAD est une marque déposée de Seqirus UK Limited ou de ses filiales. Monographies de produits disponibles sur demande
CAN-FCV-24-0014

