

Prevnar 20^{MC}

Pfizer
Vaccins

**Vous avez
50 ans
ou plus?**

**Votre risque de pneumonie
à pneumocoque augmente.**

**MÊME LES
HÉROS**
*comme vous peuvent
penser à prévenir la*
**PNEUMONIE À
PNEUMOCOQUE***

* Cas fictif pouvant ne pas être représentatif de la population générale.

**PARLEZ DE PREVNDAR 20^{MC} À VOTRE
MÉDECIN, VOTRE INFIRMIÈRE OU
VOTRE PHARMACIEN.**

PREVNAR 20 est un vaccin antipneumococcique qui contribue à protéger les adultes de 18 ans ou plus contre certaines maladies comme la pneumonie, la pneumonie bactériémique, la sepsie ou la bactériémie et la méningite causées par 20 types de la bactérie *Streptococcus pneumoniae*.

Qu'est-ce que la pneumonie à pneumocoque?



Il s'agit d'une infection des poumons causée par une bactérie courante, *Streptococcus pneumoniae*



Une infection qui se transmet d'une personne à une autre lors de contacts étroits ou lorsqu'une personne tousse ou parle.



Une infection qui peut mettre la vie en danger et nécessiter une hospitalisation ou l'admission dans une unité de soins intensifs.

PREVNAR 20 n'est pas indiqué pour réduire les complications liées aux pneumocoques, comme l'hospitalisation et la mort.

Qui risque d'en être atteint?

Des études ont établi que **les adultes de 50 ans ou plus présentent un risque accru.**

Des études ont établi que les adultes de 18 ans ou plus avec l'un des facteurs de risque suivants présentaient un risque accru* :

Diabète



Augmentation du risque de 3 fois par rapport aux adultes en santé

Tabagisme



Augmentation du risque de 3 à 4 fois par rapport aux adultes en santé

Maladie cardiaque chronique



Augmentation du risque de 4 à 5 fois par rapport aux adultes en santé

Maladie pulmonaire chronique[†]



Augmentation du risque de 4 à 10 fois par rapport aux adultes en santé

† Incluant l'**asthme** et la MPOC.

Des études ont établi que d'autres facteurs ont été associés à **une hausse du risque de pneumonie à pneumocoque :**

- Cancer
- Maladie hépatique chronique
- Alcoolisme
- Certaines affections neurologiques
- Vie en établissement de soins de longue durée

Vérifiez si vous présentez un risque accru sur le site Web pour les consommateurs

Prevnar20.ca/fr

MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique

* Une comparaison des taux de pneumocoque chez des adultes immunocompétents atteints de maladies chroniques, chez des adultes immunodéprimés et chez des adultes exempts de ces maladies a été réalisée à partir d'informations provenant de bases de données sur les soins de santé aux États-Unis allant de 2006 à 2010. Les profils de risque et les épisodes de pneumocoque – pneumonie toutes causes confondues, pneumonie pneumococcique et pneumocoques invasives – ont été établis sur la base des codes de diagnostic, d'intervention et de traitement.

Cette maladie peut être prévenue par la vaccination

PREVNAR 20 est un vaccin de Pfizer qui protège contre la pneumonie à pneumocoque causée par **20 sérotypes de *Streptococcus pneumoniae*** (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F et 33F).

Une dose du vaccin PREVNAR 20 peut aider à prévenir la pneumonie à pneumocoque.



* Cas fictif pouvant ne pas être représentatif de la population générale.

PREVNAR 20 ne prévient que les maladies causées par les types de la bactérie *Streptococcus pneumoniae* présents dans le vaccin, et il ne réduit pas les complications liées aux pneumocoques, comme l'hospitalisation.

PREVNAR 20 ne doit pas être administré aux personnes allergiques (hypersensibles) aux substances actives qu'il renferme, à tout autre ingrédient du produit ou à tout autre vaccin qui contient l'anatoxine diphtérique.

Faites particulièrement attention avec PREVNAR 20 si :

- vous avez ou avez eu des problèmes médicaux après avoir reçu une dose de PREVNAR 20, de PREVNAR 13 ou de PREVNAR, par exemple une réaction allergique ou des difficultés à respirer;
- vous avez une maladie sévère ou une forte fièvre;
- vous avez un trouble de la coagulation ou avez facilement des ecchymoses (bleus);
- votre système immunitaire est affaibli par une maladie ou par un médicament; vous pourriez ne pas retirer tous les bienfaits possibles de PREVNAR 20.

Si vous êtes enceinte, croyez l'être ou prévoyez le devenir, ou encore si vous allaitez, demandez conseil à votre professionnel de la santé avant de recevoir ce vaccin.

Les effets secondaires fréquents, qui ont été signalés chez plus de 1 personne sur 100, mais au maximum chez 1 personne sur 10 sont l'enflure ou la rougeur au point d'injection et la fièvre. Les effets peu fréquents, rapportés par plus de 1 personne sur 1000, mais au maximum chez 1 personne sur 100 sont les réactions allergiques (pouvant provoquer de l'enflure, un essoufflement et une respiration sifflante), la diarrhée, les nausées et les vomissements, les éruptions cutanées et l'enflure du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge pouvant causer une difficulté à avaler ou à respirer, les démangeaisons ou l'urticaire au point d'injection, l'enflure des glandes du cou, des aisselles ou de l'aîne, et les frissons. Les effets secondaires suivants ont été observés chez des patients qui ont reçu PREVNAR 13 et pourraient se produire chez des patients vaccinés par PREVNAR 20 : réaction allergique sévère, état de choc ou collapsus cardiovasculaire, enflure des lèvres, du visage ou de la gorge, gonflement des ganglions lymphatiques près du point de vaccination, urticaire, rougeur, irritation et démangeaison au point d'injection, et éruption cutanée composée de taches rouges qui démangent.

Comme tous les vaccins, PREVNAR 20 ne protège pas toutes les personnes qui le reçoivent.

PREVNAR 20 est remboursé par certains **régimes d'assurance privés**. Pour savoir si votre régime le rembourse, communiquez avec votre assureur et fournissez le DIN 02527049.

Aidez à vous protéger contre
la pneumonie à pneumocoque

MÊME LES
HÉROS
comme vous peuvent
penser à une protection*

* Cas fictif pouvant ne pas être représentatif
de la population générale.

**PARLEZ DE PREVJAR 20 À VOTRE
MÉDECIN, VOTRE INFIRMIÈRE OU VOTRE
PHARMACIEN DÈS AUJOURD'HUI.**

Vous ne savez pas trop comment amorcer la discussion?

Demandez à votre médecin, à votre infirmière ou à votre pharmacien si votre situation vous expose à un risque de pneumonie à pneumocoque :

- Votre âge
- Vos problèmes de santé
- Votre système immunitaire
- Vos médicaments

**Prenez dès maintenant
rendez-vous pour vous faire
vacciner** auprès de votre médecin
ou de votre pharmacien, ou en
visitant le site Web à l'intention
des patients **Prevjar20.ca/fr**.



PREVNAR 20^{MC} Wyeth LLC,
Pfizer Canada SRI, licencié
© 2024 Pfizer Canada SRI,
Kirkland (Québec) H9J 2M5
PP-PNR-CAN-0181-FR

